

Д. Н. ФЛОРОВ

СОВКИ ПРИБАЙКАЛЯ (ПОДСЕМ. AGROTINAE)

Бабочки принадлежат к числу слабоизученных насекомых Восточной Сибири: неизвестны их видовой состав, биология, распространение; недостаточно разработаны меры борьбы с теми из них, которые наносят ущерб сельскому и лесному хозяйству.

Нами поставлена задача, изучив всевозможные материалы, в течение ближайших лет создать монографическую работу «Бабочки Прибайкалья». В настоящее время закончена обработка данных о совках подсемейства Agrotinae Прибайкалья,¹ материалы о видовом составе которых и сообщаются. В основу классификации Agrotinae положены исследования И. В. Кожанчикова (1937).

Семейство Noctuidae

Подсемейство Agrotinae

1. *Triphaena* Hb.

1. *T. chardinyi* Bd.
2. *T. sobrina* Bd.
3. *T. (Spaelotis) augur* F.
4. *T. (Spaelotis) ravida* Schiff (-obscura Brahm).
5. *T. (Paradiarsia) punicea* Hb.
6. *T. (Paradiarsia) herzi* Chr.
7. *T. (Euschesis) polygona* Schiff.

2. *Graphiphora* Ochs.

1. *G. invenusta* Kozh.
2. *G. stupenda* Btl.
3. *G. c—nigrum* L.
4. *G. baja* F (-bajula Stgr).

¹ Под Прибайкальем понимается территория Иркутской области (восточные и некоторые северные районы) и Бурятской АССР (Тункинский край и часть северо-западных районов).

5. *G. fuscostigma* Brem¹.
6. *G. kollari* Ld.
7. *G. triangulum* Hüfn.
8. *G. ditrapezium* Schiff.
9. *G. collina* Bd. (*kenteana* Stgr.).
10. *G. ashworthii* Doub¹.
11. *G. descripta* Brem.
12. *G. wockei* Möschl.
13. *G. (Pachnobia) speciosa* Hb.
14. *G. (Pachnobia) sajana* Tschetv.
15. *G. (Pachnobia) tecta* Tr. (*-cinerea* Stgr.). ¹
16. *G. (Pachnobia) rhaetica* Stgr.
17. *G. (Pachnobia) adducta* Herz.¹
18. *G. (Anomogyna) laetabilis* Zett.
19. *G. (Anomogyna) filipjevi* Schel.
20. *G. (Anomogyna) subgrisea* Stgr.
21. *G. (Anomogyna) albuncula* Ev.
22. *G. (Anomogyna) sublima* Kozh.¹

3. *Estimaja* Kozh.

E. herrich-schaefferi Alph.

4. *Licophotia* Hb.

1. *L. cissigma* Mén.
2. *L. (Eugraphe) signa* F.
3. *L. (Eugraphe) subrosea* Steph.
4. *L. (Eugraphe) senescens* Stgr.

5. *Netrocerocora* Bart.

N. quadrangula Ev.

6. *Eurois* Hb.

1. *E. occulta* L.
2. *E. exusta* Btl.

7. *Cerastis* Ochs.

1. *C. rubricosa* Schiff.
2. *C. leucographa* Schiff.

8. *Aplecta* G.

A. prasina Schiff.

9. *Caradrina* Ochs.

1. *C. simulans* Hüfn.
2. *C. ledereri* Ersch.
3. *C. (Chersotis) caradrinoides* Stgr.
4. *C. (Chersotis) deplana* Frr.
5. *C. (Chersotis) rectangula* Schiff.

6. *C. (Chersotis) ocellina* Schiff.
7. *C. (Chersotis) melancholica* Ld.
8. *C. (Chersotis) difficilis* Ersch.
9. *C. (Chersotis) albifurca* Ersch.
10. *C. (Chersotis) precipua* Stgr.
11. *C. (Chersotis) ononensis* Brem.

10. *Protexarnis* McD.

P. squalida Gn.

11. *Axylia* Hb.

A. putris L.

12. *Diarsia* Hb.

1. *D. rubi* View.
2. *D. brunnea* Schiff.
3. *D. canescens* Btl.
4. *D. dahlia* Hb.
5. *D. festiva* Schiff (v. *conflua* Tr.).

13. *Ochropleura* Hb.

1. *O. fennica* Tausch.
2. *O. praecox* L. (основная форма и *f. praecurrens* Stgr.).
3. *O. musiva* Hb.
4. *O. stenzi* Ld.
5. *O. plecta* L.
6. *O. ignara* Stgr.¹.

14. *Agrotis* Ochs.

1. *A. ypsilon* Rott.
2. *A. honesta* Stgr.
3. *A. pulchrella* B.—H¹.
4. *A. nigrita* Graes.
5. *A. maerens* Stgr.
6. *A. patula* Wlk. (-*septentrionalis* Mösch).
7. *A. tokionis* Btl.
8. *A. ruta* Ev.
9. *A. fatidica* Hb.
10. *A. trifurca* Ev.
11. *A. robusta* Ev.¹
12. *A. vestigialis* Rott.¹
13. *A. exclamationis* L.
14. *A. ripae* Hb.
15. *A. cinerea* Schiff.¹

¹ Необходимы дополнительные материалы, подтверждающие распространение в Прибайкалье.

16. *A. corticea* Schiff.

17. *A. grisea* Kozt.

15. *Euxoa* Hb.

1. *E. (Chorisagrotis) lidia* Cram.

2. *E. (Chorisagrotis) inexpectata* Alph.

3. *E. sibirica* Bd.

4. *E. cursoria* Hüfn.

5. *E. phantoma* Kozh.

6. *E. islandica* Stgr.

7. *E. conspicua* Hb.¹

8. *E. aquilina* Schiff

9. *E. tritici* L.

10. *E. nigricans* L.

11. *E. (Menada) recussa* Hb.

12. *E. (Menada) filipjevi* Kozh.¹

13. *E. (Menada) varia* Alph.

Кроме указанных 94 видов нам известны еще пять совок Прибайкалья:

1. *D. kolyme* Herz (Хамар-Дабан, Харик, Хаптагол — сборы С. Н. Родионова в 1914 г.).

2. *G. imperita* Hb. (Монды, 1916 г., А. И. Мыльников).

3. *C. Sunoina* Stgr. (Монды, 1916 г., А. И. Мыльников).

4. *C. anguroides* Roth. (материалы Иркутского облмузея).

5. *C. cicatricosa* Graes (Култук, 1911 г., С. Н. Родионов). Определение этих видов совок (кроме *G. kolyme* Herz) по одним внешним признакам произведено Н. Н. Филиппевым, в 1938—1940 гг. и вызывает у нас сомнение. Лишь получение дополнительных материалов из Прибайкалья и детальное изучение гениталий бабочек, а также сравнение всех данных может подтвердить справедливость определения Н. Н. Филиппева.

Прибайкалье — горная страна. Из числа совок некоторые являются высокогорными и найдены на границе произрастания здесь древесной и кустарниковой растительности (например, *C. rectangula* Schiff., *A. prasina* Schiff. и др.), многие имеют весьма широкий диапазон распространения: встречаются на склонах, подошвах и равнинах, типичных степняков — маловидов. Бабочки совок — сумеречные или ночные, за исключением *T. chardinyi* Bd., летающей днем; зимуют обычно взрослые гусеницы. Для большинства совок кормовые растения не установлены.

К вредителям сельскохозяйственных растений (огородных, технических культур, злаков) относятся: *G. baja* F., *G. ditrapezium* Schiff., *E. occulta* L., *P. squalida* Gn., *O. fennica* Tausch., *A. exclamationis* L., *A. corticeae* Schiff., *E. lidia* Cram., *E. inexpectata* Alph., *E. sibirica* Bd., *E. cursoria* Hüfn., *E. phantoma*

¹ Необходимы дополнительные материалы, подтверждающие распространение в Прибайкалье.

Kozh., *E. islandica* Stgr., *E. tritici* L., *E. nigricans* L. и *E. varia* Alph. По общему числу видов Agrotinae Прибайкалье богаче, чем, например, Западная Сибирь, и едва ли уступает в этом отношении многим районам Европейской части Союза ССР. Здесь имеется ряд эндемичных видов, многие совки образуют очень характерные формы, распространение которых нередко локализовано ограниченной территорией.